



Genetická analýza populace koroptve polní (*Perdix perdix*) v ČR

Sběr vzorků koroptve polní v ČR

Odběr peří (NE PRACHOVÉ) z nohy, hrudníku, z pod křídla (celkem 5 - 10 ks na jedince). Je nutné, aby peří mělo na konci pulpu (špička peří obsahující buňky). Nesmí být ustřížené, vypadnuté a nelze použít peří prachové. Pokud jsou pera velmi malá a pulpa těžce spatřitelná, prosím vytrhněte peří více (10 - 15 ks). Stejně se postupuje i u sběru muzejních vzorků. Vytržená pera (mimo muzejní vzorky) nechte cca hodinu zaschnout na vzduchu. Poté vložte do papírové obálky či papírového sáčku. Sáčky s peřím uchovejte v suchu v pokojové teplotě. Není potřeba, aby bylo peří krvavé. Pokud však jsou na pulpě znaky krve, nechte peří pořádně zaschnout (několik hodin na vzduchu). K vzorkům je nutno uvést místo nálezu, datum nálezu, původ vzorku (odběr z živého, mrtvého zvířete či muzejního vzorku), kontakt na poskytovatele vzorku.

Kontakt pro předání vzorků či doplňující informace

Jaroslav Hyjánek, zastupce@zoodk.cz, tel. + 420 776 260 901
Michal Podhrazský, ptaci@zoodk.cz, tel. +420 775 854221

Výzkumný institut ochrany genofondů, v. v. i.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem